



Sibiu
Nr. 464 /O/25 .04.2017

INFORMARE

TÂNȚARUL FRUNZELOR DE BUXUS – *Monarthopalpus buxi* (Kieff.)



Planta gazdă: - Buxus (*Buxus serpenvirens*)

Organe atacate: - aparat foliar;

Forma de manifestare: Frunze gofrate de culoare galben – ruginiu în contrast cu verde brumăriu care reprezintă culoarea lor normală.



Atacul este produs de larvele (miniere) dăunătorului care distrug țesuturile dintre epiderme;

La atac puternic poate cauza uscarea ramurilor și căderea aparatului foliar.

Descriere: Adult galben-portocaliu, de 3-4 mm lungime. Larvele sunt de culoare portocalie, de 3 - 4 mm lungime;

- Iernează în stadiul de larvă în țesuturile frunzelor, loc unde în luna aprilie are loc împuparea;


- Adulții apar spre sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai;

- Ouăle sunt depuse în țesuturile frunzelor.

Măsuri de prevenire și combatere:

- Eliminarea ramurilor cu simptome de atac și arderea acestora.

- Pentru combaterea chimică a dăunătorului, nu sunt produse de protecție a plantelor omologate.



COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR
Elena STANCU

ÎNTOCMIT
Cons. sup. Ana TIMA